


www.advantaseeds.com

सर्दी के चारों का राजा मकरखन घास



लोट : मकरखन घास के गिराते जुलते अद्य लाग वाले उत्पादों से बचो।



Give a call on:
1800 102 1199

- एक वर्षायि बहु कटाई वाला घास
- अधिक पोषण एवं उच्च प्रोटीन
- दूध एवं गुणवत्ता में वृद्धि

8.5" (W) X 5.5" (H)

 ADVANTA

अच्छे परिणाम
के लिए इसी पैकेट
को खरीदें!


Forage
Samridhi Ka Vishwas

मकरखन ग्रास

बेहतर प्रबन्धन के लिए महत्वपूर्ण सूचना

- | | |
|------------------------|---|
| मिट्टी | : सामान्य पीएच (5 से 6) वाली सभी तरह की कृषि मिट्टी उपयुक्त है। |
| बुवाई समय | : मक्खन ग्रास शीतकालीन चारा फसल है और पहाड़ी व समतल इलाकों में बुवाई के लिए उपयुक्त है। |
| समतल | : सितंबर से दिसंबर। |
| पहाड़ी | : (1) सितंबर से अक्टूबर (2) मार्च से अप्रैल |
| खेत की तैयारी | : मक्खन ग्रास के बीज वज़न में बहुत हल्के होते हैं, इसलिए बुवाई की विधि बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को तैयार इस तरह करें की उपरी परत भुर भुरी होनी चाहिए जिससे मिट्टी की पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। |
| बीजाई दर | : (1) विशुद्ध फसल बुवाई: प्रति एकड़ 5 से 6 किंवा। (2) बरसीम के साथ: प्रति एकड़ 2 से 3 किंवा। |
| बीजाई विधि | : मक्खन ग्रास 30-35 सेमी. पर पंक्ति में बोया जा सकता है। स्प्रेडर, सीड़र, हाइड्रोसीडर या हाथों के माध्यम से बीजों के छितराव द्वारा बीज बोए जा सकता है। ध्यान रखें कि बीज 1/2 इंच ऊपरी मिट्टी से ज्यादा न ढंकें। बीज और मिट्टी अच्छे संपर्क के लिए रोल करें। |
| तापमान | : मिट्टी का तापमान 18 डिग्री से. से अधिक होना चाहिए अंकुरण और जड़ के विकास के लिए अनुकूल मिट्टी तापमान 24 डिग्री से 27 डिग्री से. है। |
| अंकुरण व स्थापन | : बीज क्यारी को नम रखें, ताकि अंकुरण को बल मिले। अनुकूल स्थितियों में 8 से 12 दिनों में अंकुरण होना चाहिए जो 18 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। सम्पूर्ण स्थापन 4 से 6 सप्ताह में होना चाहिए दिनांक, बुवाई विधि, मिट्टी में नमी तत्व और जलवायु तापमान के अनुसार स्थापन समय अलग- अलग हो सकता है। |
| उर्वरक | : बुवाई के बाद 24 किंवा. नाइट्रोजन और 16 किंवा. फॉस्फोरस प्रति एकड़ की दर से और प्रत्येक कटाई के बाद प्रति एकड़ 12 किंवा. नाइट्रोजन के रूप में उर्वरक प्रयोग करना चाहिए। |
| सिंचाई | : अंकुरण के बाद 2-3 सप्ताह बाद पहली सिंचाई की जाती है। बाद में 20 दिन के अंतराल में या आवश्यकता अनुसार। पहली सिंचाई के बाद हाथ से निराई और प्रति एकड़ 8 किंवा. नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। |
| कटाई | : पहली कटाई (50-60 सेमी.) या बुवाई से 45 से 50 दिन बाद की जाती है। बाद की कटाई विकास के अनुसार 25 से 30 दिन के अंतराल पर होनी। |

यू पी एल लिमिटेड

C/o भारती ब्रह्मा सीझ

सर्वे नं ४२४, ४२५ & ४२६

नूतनपक्षल, मेडुबल पंडुल, जिला : मेडुबल-501 401, देलानगामा.

四

